

Anticonceptie

Gebruikt u momenteel voorbehoedsmiddelen?

Ja Nee

Indien ja, noteer dan hier de namen van deze middelen:

Neem deze kaart mee naar uw arts of gynaecoloog bij uw volgende bezoek en hij/zij zal u adviseren over de noodzaak om aanvullende of alternatieve anticonceptiemethoden te gebruiken.

ZENTIVA

1065040285

Belangrijke veiligheidswaarschuwingen voor patiënten die Bosentan Zentiva (bosentan) gebruiken

Deze kaart bevat belangrijke informatie over Bosentan Zentiva. Leest u deze kaart zorgvuldig vóór u begint met uw behandeling met Bosentan Zentiva.

Uw naam:

Behandelend arts:

Neem bij vragen over Bosentan Zentiva contact op met uw arts.
Zentiva k.s.

Indien u een vrouw bent die zwanger kan worden, lees dan deze pagina zorgvuldig

Zwangerschap

Bosentan Zentiva kan schade toebrengen aan de ontwikkeling van de foetus. Daarom mag u geen Bosentan Zentiva gebruiken als u zwanger bent en mag u ook niet zwanger worden als u Bosentan Zentiva gebruikt. Bovendien, indien u lijdt aan pulmonale hypertensie, kan zwangerschap de symptomen van uw ziekte ernstig versterken. Indien u vermoedt dat u zwanger bent, vertel dit aan uw arts of aan uw gynaecoloog.

Anticonceptie

Hormonale voorbehoedsmiddelen - zoals orale anticonceptiva, de pil, hormooninjecties, implantaten of anticonceptiepleisters - zijn niet betrouwbaar bij het voorkomen van een zwangerschap bij vrouwen die Bosentan Zentiva gebruiken. U dient tevens een barrièremethode te gebruiken - zoals condoom, pessarium of vaginale spons – naast de genoemde vormen van hormonale voorbehoedsmiddelen. Bespreek iedere eventuele vraag met uw arts of uw gynaecoloog – vul de achterzijde van deze kaart in en geef deze aan uw arts of gynaecoloog bij de volgende afspraak. U dient een zwangerschapstest te doen vóór u met Bosentan Zentiva begint en vervolgens iedere maand van de behandeling, zelfs als u denkt dat u niet zwanger bent.

Datum van de eerste maandelijkse test:

Bloedtest voor leverfunctiebepaling

Bij sommige patiënten die Bosentan Zentiva innamen, werd een abnormale leverfunctie waargenomen. Tijdens de behandeling met Bosentan Zentiva zal uw arts zorgen voor regelmatige controles van uw bloed om uw leverfunctie te controleren.

Denk er aan om iedere maand een bloedtest voor de controle van uw leverfunctie te laten uitvoeren.

Twee weken na een verhoging van de dosering moet een extra test worden uitgevoerd.

Datum van de eerste maandelijkse test:

Uw schema voor maandelijkse leverfunctietests:

<input type="checkbox"/> jan	<input type="checkbox"/> mei	<input type="checkbox"/> sep
_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> feb	<input type="checkbox"/> jun	<input type="checkbox"/> okt
_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> mrt	<input type="checkbox"/> jul	<input type="checkbox"/> nov
_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> apr	<input type="checkbox"/> aug	<input type="checkbox"/> dec
_____	_____	_____