

- Vertel het uw zorgverlener als u nog andere geneesmiddelen gebruikt, dat kort geleden heeft gedaan of van plan bent te gaan doen, voordat u met Rivaroxaban Zentiva begint.
- Vertel uw zorgverlener dat u Rivaroxaban Zentiva gebruikt voordat u een operatie of een procedure ondergaat waarbij het lichaam wordt binnengegaan.

Wanneer moet ik mijn zorgverlener raadplegen?

Bij inname van een bloedverdunner, zoals Rivaroxaban Zentiva, is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de mogelijke bijwerkingen

ervan. Een bloeding is de meest voorkomende bijwerking. Als u weet dat u een risico op bloedingen hebt, start dan niet met de inname van Rivaroxaban Zentiva zonder dit eerst met uw arts te hebben besproken. Vertel het uw zorgverlener direct als u klachten of symptomen van bloedingen heeft, zoals de volgende:

- pijn
- zwelling of ongemak
- hoofdpijn, duizeligheid of zwakte
- ongebruikelijke blauwe plekken, bloedneus, bloeding van tandvlees, snijwondjes die lang blijven bloeden

Patiënteninformatiekaart

- Rivaroxaban Zentiva 2,5 mg
- Rivaroxaban Zentiva 10 mg
- Rivaroxaban Zentiva 15 mg
- Rivaroxaban Zentiva 20 mg

**Draag dit kaartje altijd bij u.
Toon dit kaartje aan elke arts of tandarts
voordat een behandeling plaatsvindt.**

Informatie voor zorgverleners:

- INR-waarden mogen niet gebruikt worden, omdat ze geen betrouwbare maat zijn voor de antistollingsactiviteit van **Rivaroxaban Zentiva**.



Wat moet ik weten over Rivaroxaban Zentiva?

- Rivaroxaban Zentiva verdunt het bloed, wat voorkomt dat u gevaarlijke bloedstolsels krijgt.
- Rivaroxaban Zentiva moet precies worden ingenomen zoals voorgeschreven door uw arts. Voor een optimale bescherming tegen bloedstolsels **mag u geen enkele dosis overslaan**.
- Stop niet met het innemen van Rivaroxaban Zentiva zonder eerst met uw arts te overleggen omdat u anders een groter risico loopt op het krijgen van bloedstolsels.

- menstruatie of vaginale bloeding die heviger is dan gewoonlijk
- bloed in uw urine waardoor die roze of bruin kan zijn, rode of zwarte stoelgang
- bloed ophoesten, of braken van bloed of materiaal dat de kleur heeft van koffiedik.

Hoe moet ik Rivaroxaban Zentiva innemen?

- Voor een optimale bescherming moet Rivaroxaban Zentiva als volgt worden ingenomen:
 - 2,5 mg kan met of zonder voedsel worden ingenomen
 - 10 mg kan met of zonder voedsel worden ingenomen
 - 15 mg moet met voedsel worden ingenomen
 - 20 mg moet met voedsel worden ingenomen

Waarschuw bij noodgevallen:

Naam arts:

Telefoon arts:

Stempel arts:

ZENTIVA

Ik word behandeld met het antistollingsmiddel Rivaroxaban Zentiva (rivaroxaban).

Naam:

Adres:

Geboortedatum:

Gewicht:

Andere geneesmiddelen / aandoeningen:

Waarschuw ook:

Naam:

Telefoon:

Relatie:

