

### Patiënteninformatiekaart

- Rivaroxaban Zentiva 10 mg
- Rivaroxaban Zentiva 15 mg
- Rivaroxaban Zentiva 20 mg

**Draag dit kaartje altijd bij u.  
Toon dit kaartje aan elke arts of tandarts voordat een behandeling plaatsvindt.**

### Informatie voor zorgverleners:

- INR-waarden mogen niet gebruikt worden, omdat ze geen betrouwbare maat zijn voor de antistollingsactiviteit van **Rivaroxaban Zentiva**.

### Wat moet ik weten over Rivaroxaban Zentiva?

- Rivaroxaban Zentiva verdunt het bloed, wat voorkomt dat u gevaarlijke bloedstolsels krijgt.
- Rivaroxaban Zentiva moet precies worden ingenomen zoals

voorgeschreven door uw arts. Voor een optimale bescherming tegen bloedstolsels **mag u geen enkele dosis overslaan**.

- Stop niet met het innemen van Rivaroxaban Zentiva zonder eerst met uw arts te overleggen omdat u anders een groter risico loopt op het krijgen van bloedstolsels.
- Vertel het uw zorgverlener als u nog andere geneesmiddelen gebruikt, dat kort geleden heeft gedaan of van plan bent te gaan doen, voordat u met Rivaroxaban Zentiva begint.
- Vertel uw zorgverlener dat u Rivaroxaban Zentiva gebruikt voordat u een operatie of een procedure ondergaat waarbij het lichaam wordt binnengegaan.

### Wanneer moet ik mijn zorgverlener raadplegen?

Bij inname van een bloedverdunner, zoals Rivaroxaban Zentiva, is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de mogelijke bijwerkingen ervan. Een bloeding is de meest voorkomende bijwerking. Als u weet dat u een risico op bloedingen hebt, start dan niet met de inname van Rivaroxaban Zentiva zonder dit eerst met uw arts te hebben besproken. Vertel het uw zorgverlener direct als u klachten of symptomen van bloedingen heeft, zoals de volgende:

- pijn
- zwelling of ongemak
- hoofdpijn, duizeligheid of zwakte
- ongebruikelijke blauwe plekken, bloedneus, bloeding van tandvlees, snijwondjes die lang blijven bloeden
- menstruatie of vaginale bloeding

die heviger is dan gewoonlijk

- bloed in uw urine waardoor die roze of bruin kan zijn, rode of zwarte stoelgang
- bloed ophoesten, of braken van bloed of materiaal dat de kleur heeft van koffiedik.

### Hoe moet ik Rivaroxaban Zentiva innemen?

- Voor een optimale bescherming moet Rivaroxaban Zentiva als volgt worden ingenomen:
  - 10 mg kan met of zonder voedsel worden ingenomen
  - 15 mg moet met voedsel worden ingenomen
  - 20 mg moet met voedsel worden ingenomen

**ZENTIVA**

